

CUADRO COMPARATIVO SOBRE AUTISMO Y EL SÍNDROME DE ASPERGER

AUTISMO

1. Coeficiente intelectual generalmente por debajo de lo normal.
2. El diagnóstico se realiza normalmente antes de los 3 años.
3. Retraso en la aparición del lenguaje.
4. Alrededor del 25 por ciento son no verbales.
5. Gramática y vocabulario limitados.
6. Desinterés general en las relaciones sociales. No desean tener amigos.
7. Un tercio presenta convulsiones.
8. Desarrollo físico normal.
9. Ningún interés obsesivo de 'alto nivel'.
10. Los padres detectan problemas alrededor de los 18 meses de edad.
11. Las quejas de los padres son los retrasos en el lenguaje.



ASPERGER

1. Coeficiente intelectual generalmente por encima de lo normal.
2. El diagnóstico se realiza normalmente después de los 3 años.
3. Aparición del lenguaje en tiempo normal.
4. Todos son verbales.
5. Gramática y vocabulario por encima del promedio.
6. Interés general en las relaciones sociales. Desean tener amigos.
7. Incidencia de convulsiones igual que el resto de la población.
8. Torpeza general.
9. Intereses obsesivos de 'alto nivel'.
10. Los padres detectan problemas alrededor de los dos años y medio.
11. Las quejas de los padres son los problemas de lenguaje, o en la socialización y la conducta.